

Untersaaten



kg/ha	CHF/kg	Zusammensetzung %										Saat mit Hauptkultur	Saat vor Reihenschluss	Erfüllt Zwischenbegrünung	Bemerkungen
		Alexandrinerklee	Bastardklee	Bockshornklee	Erdklee	Gelbklee	Inkarnatklee	Weissklee kb	Buchweizen	Guizotia	Sommerlein				

Getreide

STEFFEN Cereal	13	13.60		25		20	25		30						●	●	👍	Herbst: Anschliessend Getreidesaat bei idealen Bedingungen bis ca. Ende Oktober Frühling: Saat zeitig im Frühjahr, sobald Boden abgetrocknet ist
STEFFEN Actihum	20	9.50							25				25	50	○	●	👍	Frühling: Saat zeitig im Frühjahr, sobald Boden abgetrocknet ist. Nicht in trockenen Regionen einsetzen (Wasserkonkurrenz)

Mais / Sonnenblumen

STEFFEN Legumino	13	11.90		40		20	10	15	15						○	●	👍	Einsatzzeitpunkt beim letzten Striegeln und Hacken krümelige Bodenoberfläche schaffen, ca. 4-6 Blatt Stadium
STEFFEN Actihum	20	9.50							25				25	50	○	●	👍	Einsatzzeitpunkt beim letzten Striegeln und Hacken krümelige Bodenoberfläche schaffen, Mais ca. 4-6 Blatt Stadium, Sonnenblumen ab 2 Blatt Stadium. Nicht in trockenen Regionen einsetzen (Wasserkonkurrenz)

Raps

STEFFEN Colza sano	20	6.90	18		20				20	17	25				●	○	👎	Bewährte Untersaat mit der schnellsten Jugendentwicklung und sehr guter Unkrautunterdrückung. Höchste Stickstofffixierung. Mit Ablenkpflanzen gegen den Erdfloh
STEFFEN Colza soleil	20	7.70			15	20			25	15	25				●	○	👎	Frostempfindlichere Mischung für wärmere Regionen. Mit niedrigwachsenden Komponenten sowie Ablenkpflanzen gegen den Erdfloh. Friert sicher ab
STEFFEN Colza relais NEU	25	8.90			15	15			20	18	10	22			●	○	👍	Frostempfindliche Mischung für wärmere Regionen. Mit niedrigwachsenden Komponenten sowie Ablenkpflanzen gegen den Erdfloh. Friert sicher ab und erfüllt Zwischenbegrünung

👍 = erfüllt 👎 = nicht erfüllt ● = empfohlen ○ = möglich ○ = nicht empfohlen

Nutzen

- Sehr gute Unkrautunterdrückung
- Zusätzliche Durchwurzelung des Bodens
- Schnellere Bodenbedeckung
- Erosionsschutz und Reduzierung von Auswaschungen
- Humusbildung
- Reduzierter Herbizid-Einsatz
- Bessere Tragfähigkeit des Bodens
- Liefert Stickstoff

Anbautipps

- Unkrautbekämpfung vor der Aussaat der Hauptkultur beginnen
- Saatzeitpunkt ist auf Hauptkultur abzustimmen (siehe oben)
- Saatmenge Hauptkultur anpassen
- Raps nicht zu wenig, Getreide nicht zu dichte Bestände
- STEFFEN Untersaaten auf frisch bearbeiteten Boden säen und walzen oder flach eindrillen
- Je exakter die Saat, desto sicherer der Erfolg!

zu beachten

- STEFFEN Untersaaten bieten einige Vorteile, jedoch falsch eingesetzt kann die Hauptkultur massiv beeinträchtigt werden und zu einem Ernteausfall führen. Folgende Punkte müssen beachtet werden:
- Auf Parzellen mit Problemunkräutern (Winden, Disteln, Quecke etc.) ist auf eine STEFFEN Untersaat zu verzichten, Unkrautregime hat Vorrang
 - Mit Untersaaten keine Konkurrenz zur Hauptkultur, betreffend Wasser, Nährstoffe und Lichteinfluss schaffen



Spezialkulturen

Ertrag	Frühreife zur Ernte	Standfestigkeit	Saatdichte Kö / m ²	Saatmenge kg / ha	Einheit	Saatzeit					Bemerkungen
						MÄR	APR	MAI	JUN	SEP	

Speisehirse

QUARTETT	+++	mittel	++		55-65	25 kg														Ideal als 2. Kultur, anspruchslos
----------	-----	--------	----	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Speiselinsen

ANICIA	++	mittelfrüh		200-300	100-125	25 kg														Hoher Ertrag, ausgezeichneter Geschmack
--------	----	------------	--	---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Sommeröllein

EMBRESS	+++	sehr früh	+++	600-650	50-60	25 kg														Hoher Ertrag, ausgeglichen
---------	-----	-----------	-----	---------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

Winteröllein

ATTILA	+++	mittelfrüh	++	350-400	30-40	25 kg														Sehr kältetolerant, gute Standfestigkeit
--------	-----	------------	----	---------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+++ = sehr gut ++ = gut + = mittel bis gut ■ = empfohlen ■ = möglich □ = nicht empfohlen